

Gestion de l'hypoglycémie

ÉLÈVES DIABÉTIQUES

Si l'élève s'est évanoui ou fait une crise d'épilepsie, appeler le 911 et le membre du personnel scolaire désigné pour administrer du glucagon en cas d'urgence (si les parents en ont fourni).

Étape 1 : Reconnaître les symptômes de l'hypoglycémie

- ▶ Sueurs
- ▶ Tremblements
- ▶ Pâleur
- ▶ Confusion ou difficulté de concentration
- ▶ Manque de coordination ou difficulté d'élocution
- ▶ Somnolence

Étape 2 : Donner du glucose à action rapide SANS TARDER

Donner du glucose à action rapide selon les consignes des parents ou sous **L'UNE** des formes suivantes :

- ▶ 3 à 4 comprimés de glucose
- ▶ 1 boîte de jus ou ½ cannette de boisson gazeuse ordinaire (non « diète »)
- ▶ 15 ml (1 c. à soupe) ou 3 sachets de sucre dissous dans de l'eau
- ▶ 15 Skittles
- ▶ 15 ml (1 c. à soupe) de miel

Étape 3 : Attendre, surveiller et répéter

- ▶ Si, après 10 minutes, les symptômes persistent, répéter l'étape 2.
- ▶ Ne jamais laisser seul un élève en hypoglycémie. S'assurer qu'un adulte le supervise jusqu'à ce que les symptômes se soient estompés.
- ▶ Consulter le plan de gestion du diabète de l'élève.
- ▶ Si l'élève perd connaissance ou est incapable de prendre du glucose à action rapide, procéder au traitement décrit ci-dessous pour l'hypoglycémie grave.

Traitement d'urgence en cas d'hypoglycémie grave

NE RIEN donner à manger ni à boire à l'élève s'il a perdu connaissance, fait une crise d'épilepsie ou est incapable d'avaler.

- ▶ Tourner l'élève sur le côté.
- ▶ Composer le 911.
- ▶ Appeler le membre du personnel scolaire désigné pour administrer du glucagon en cas d'urgence (si les parents en ont fourni).
- ▶ Après avoir appelé le 911, appeler les parents.



First Nations Health Authority
Health through wellness



fraserhealth

Better health. Best in health care.



Interior Health
For your whole life



island health



northern health
the northern way of caring

