

BC PharmaCare

Tiras reactivas de glucosa en sangre

BC PharmaCare cubre un número determinado de tiras reactivas de glucosa en sangre al año, según el tratamiento contra la diabetes que esté recibiendo.

Límites anuales de las tiras reactivas

Si se encuentra en más de una de estas categorías de tratamiento, tendrá cobertura por el límite más alto:

Con insulina y sin monitor de glucosa continuo o flash. **Límite anual:** 3000

Con insulina y con un monitor de glucosa continuo o flash. **Límite anual:** 200

Antihiperoglucémicos con mayor riesgo de provocar hipoglucemia (por ejemplo, secretagogos de insulina -sulfonilureas como la gliburida- y meglitinidas como la repaglinida). **Límite anual:** 400

Antihiperoglucémicos con un menor riesgo de causar hipoglucemia (por ejemplo, inhibidores de la alfa-glucosidasa como la acarbose; biguanidas como la metformina; inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) como la linagliptina; miméticos de incretina/agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP- 1) como la semaglutida; inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) como la empagliflozina; tiazolidinedionas (TZD), como la pioglitazona). **Límite anual:** 200

Dieta/ejercicio. **Límite anual:** 200

- Cuando compra tiras reactivas, el sistema informático (PharmaNet) descuenta el importe de su límite anual
- Si cambia de tratamiento, su límite anual se actualiza automáticamente en PharmaNet
- Para saber cuántas tiras le quedan, llame a HIBC (número indicado a continuación)
- Asegúrese de que la fecha de caducidad de las tiras que compra le dé suficiente tiempo para usarlas en el futuro
- Hable con su profesional médico o educador en diabetes sobre la frecuencia con que debe hacerse las pruebas o visite diabetes.ca/takecharge

Si necesita más tiras

Su médico o su centro de educación diabética pueden solicitar a PharmaCare la cobertura de tiras adicionales si necesita hacerse pruebas con más frecuencia, si no utiliza insulina y si:

- No ha alcanzado los objetivos de nivel de glucosa en sangre determinados por un/a médico, durante 3 meses o más
- Tiene una enfermedad o afección aguda que pueda afectar al control de su glucemia
- Ha empezado a tomar o dejó de tomar medicamentos que inducen hipoglucemia o hiperglucemia
- Tiene un trabajo en el que la hipoglucemia suponga un riesgo importante para la seguridad (por ejemplo, pilotos, conductores comerciales)
- Padece diabetes gestacional

En casos excepcionales, si tiene una necesidad médica de realizar pruebas con más frecuencia, o toma insulina y necesita hacerse pruebas con más frecuencia, su endocrinólogo/a puede enviar una solicitud a PharmaCare para obtener tiras adicionales.

¿Preguntas?

Llámenos al 1 800 663-7100 de lunes a viernes de 8 am a 8 pm y los sábados de 8 am a 4 pm